呉医療センター採用医薬品　簡易懸濁可否一覧表

〇：可、△：条件付きで可、×：不可
破壊：錠剤のフィルムコーティングに亀裂を入れる、粉砕：調剤時に粉砕化する
ハ：内服薬経管投与ハンドブック(第3版)、製：製薬会社回答、東：東京医療センター簡易懸濁法データベース、服：服アド手帖　お薬虎の巻(10版)
※後発品はメーカーにより可否・条件が異なる場合があります。
※腸溶錠は腸瘻であれば投与可能です。

	医薬品名	可否（〇△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
ア	アイセントレス錠400mg	×		－	破壊にて懸濁可能。通過性不明。	服
	アイトロール錠20mg	〇		8		ハ
	アキネトン細粒1％	〇		8	分散性不良	ハ
	アグリリンカプセル0．5mg	－			データなし	製
	アコファイド錠100mg	〇		8		製
	アザルフィジンEN錠500mg	×		8	腸溶錠	東
	アジルバ錠20mg	〇		8		東
	アジレクト錠0．5mg	－			データなし	製
	アジレクト錠1mg	－			データなし	製
	アスパラカリウム散50％	×			切替→KCl	
	アスパラカリウム錠300mg	×			吸湿固化	ハ
	L－アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	×		12	12Fr.より投与可	製
	アスピリン「ホエイ」	〇				東
	アスペノンカプセル10　10mg	〇		8	局所麻酔作用	ハ
	アスベリン散10％	〇		8		ハ
	アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」	〇		8		ハ
	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	〇		8		東
	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	△	破壊			
	アゾセミド錠30mg「JG」	〇		8		製
	アタラックスーPカプセル25mg	〇		8		ハ
	アデホスコーワ顆粒10％	×			18Fr.	ハ
	アドソルビン原末	〇		8	分散性不良	ハ
	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	〇		8		製
	アナフラニール錠25mg	△	破壊			ハ
	10％アプレゾリン散「SUN」	〇		8		ハ
	アボルブカプセル0．5mg	×			難溶性・曝露	製
	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	〇		8		
	アミティーザカプセル24μg	〇		8	軟カプセル	東
	アミノレバンEN配合散	×		12	12Fr.より投与可	ハ
	アムロジピンOD錠2．5mg「トーワ」	〇		8	OD	ハ
	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	〇		8	OD	ハ
	アモキサンカプセル25mg	〇		8		ハ
	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	〇		8		ハ
	アルギU配合顆粒	〇		8		ハ
	アルサルミン細粒90％	〇		8		ハ
	アルダクトンA細粒10％	〇		8		ハ
	アルドメット錠250　250mg	〇		8		ハ
	アルファカルシドール錠0．5μg「アメル」	△	破壊	8		
	アルプラゾラム錠0．4mg「トーワ」	〇		8		ハ
	アレジオンドライシロップ1％	〇		8		東
	アレビアチン散10％	〇		8	錠剤は〇	東
	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	〇		8		ハ
	アローゼン顆粒	×			14Fr. 代替→センノサイド顆粒	ハ
	アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」	△	破壊	8		ハ
	アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	△	破壊	8		ハ
	アロプリノール錠100mg「杏林」	〇		8		ハ
	安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	〇		8		製
	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	〇		8		ハ
	イーケプラドライシロップ50％	〇		8		製
	イーケプラ錠250mg	〇		8		東
	イーケプラ錠500mg	〇		8		東
	イグザレルト錠10mg	〇		8		ハ
	イグザレルト錠15mg	〇		8		ハ
	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	〇		8		ハ
	イスコチン原末	〇		8		東
	イスコチン錠100mg	〇		8	光・防湿	ハ
	イトラコナゾール錠50「MEEK」 50mg	△	破壊	8		製
	EPLカプセル250mg	×			油状	ハ
	イフェクサーSRカプセル37．5mg	×			徐放性	東
	イフェクサーSRカプセル75mg	×			徐放性	東
	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	△	破壊			製
	イミグラン錠50　50mg	〇		8		ハ
	イムラン錠50mg	〇		8	曝露注意	ハ
	イメンドカプセル80mg	〇		8		東
	イメンドカプセルセット	〇		8		東
	イリボーOD錠2．5μg	〇		8		東
	インヴェガ錠3mg	×			徐放性	東
	インヴェガ錠6mg	×			徐放性	東
	インテバンSP25　25mg	〇		8	2020/3/31経過措置	ハ
	インデラル錠10mg	〇		8	遮光	ハ
	ウインタミン細粒（10％）	〇		8		ハ
	ヴォリブリス錠2．5mg	－			データなし	製
	ウプトラビ錠0．2mg	〇		8		東
	ウプトラビ錠0．4mg	〇		8		東
	ウブレチド錠5mg	〇		8		ハ
	ウラリットーU配合散	〇		8		ハ
	ウリアデック錠20mg	〇		8		製
	ウリアデック錠40mg	〇		8		製
	ウリアデック錠60mg	〇		8		製
	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	〇		8		ハ
	ウルソ顆粒5％	〇		8		ハ
	エースコール錠2mg	〇		8		ハ
	エカード配合錠HD	〇		8		東

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	エクア錠50mg	○		8		東
	エクセグラン散20%	○		8		ハ
	エクセグラン錠100mg	○		8		ハ
	エストリール錠1mg（持田）	○		8		ハ
	エチゾラム錠0．5mg「EMEC」	○		8		ハ
	エチゾラム錠1mg「EMEC」	○		8		ハ
	エディロールカプセル0．75μg	○		8		東
	エトドラク錠200mg「トーワ」	○		8		ハ
	エナラプリルM錠5「EMEC」 5mg	○		8		
	エバスチンOD錠10mg「日医工」	○		8		ハ
	エバミール錠1．0 1mg	○		8		ハ
	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	×			データなし	
	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	○		8		製
	エビプロスタット配合錠DB	×			腸溶性	ハ
	エビリファイOD錠12mg	○		8		ハ
	エビリファイ錠6mg	○		8		ハ
	エピレオプチマル散50%	△	水	8	融点：48℃	ハ
	エフィエントOD錠20mg	○		8		ハ
	エフィエント錠3．75mg	△	常温の水	8	55℃で含量低下	ハ
	エプクルーサ配合錠	○		－	通過のデータなし	製
	エプジコム配合錠	△	破壊			ハ
	エブトール250mg錠	△	破壊	－	吸湿性。病棟にて破壊。	製
	エフピーOD錠2．5 2．5mg	○		8		製
	エブランチルカプセル30mg	○		8		東
	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	△	破壊	8		ハ
	エリキュース錠2．5mg	○		8		ハ
	エリキュース錠5mg	○		8		ハ
	エルカルチンFF錠100mg	△	破壊			製
	エルカルチンFF錠250mg	△	破壊			製
	エレルサ錠50mg	－			データなし	製
	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	－			データなし	
	エレンタール配合内用剤	－			データなし	
	塩化カリウム「日医工」	○		8		製
	塩化ナトリウム「オーツカ」	○				東
	エンタカポン錠100mg「KN」	○		8		製
	エンテカビルOD錠0．5mg「サワイ」	○		8		製
	オーグメンチン配合錠250RS 375mg	○		8		東
	オーラップ細粒1%	－			データなし、錠剤は可	
	オゼックス細粒小児用15% 150mg	○		8		東
	オセルタミビルDS3%「サワイ」	○		8		製
	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	－			データなし	
	オフェブカプセル100mg	×			難溶性・曝露	製
	オフェブカプセル150mg	×			難溶性・曝露	製
	オラペネム小児用細粒10% 100mg	○		8		東
	オランザピンOD錠2．5mg「トーワ」	○		8		東
	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	○		8		東
	オランザピンOD錠10mg「トーワ」	○		8		東
	オランザピン細粒1%「トーワ」	○		8		製
	オルケディア錠1mg	○		8		東
	オルケディア錠2mg	○		8		東
	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	○		8		製
	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	○		8		ハ
	オングリザ錠5mg	○		8		製
	ガスコン錠40mg	○		8		ハ
	ガスモチン散1%	○		8		東
	ガスモチン錠5mg	○		8		ハ
	カタプレス錠75μg 0．075mg	○		8		東
	カナマイシンカプセル250mg「明治」	○		8		ハ
	ガバペン錠200mg	△	破壊	8		東
	ガバペン錠300mg	△	破壊	8		東
	カプトリル錠12．5mg	○		8		ハ
	カベルゴリン錠0．25mg「サワイ」	△	14minで崩壊	8		製
	カベルゴリン錠1．0mg「サワイ」 1mg	○		8		ハ
	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	○		8		ハ
	ガランターゼ散50%	△	水	8	50℃以下で懸濁（55℃で分解）	製
	カリクレイン錠10単位	×			55℃で失活	ハ
	カルシトリオールカプセル0．25μg「サワイ」	－			データなし	製
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	－			データなし	製
	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	○		8		製
	カルベジロール錠2．5mg「サワイ」	○		8		ハ
	カルベジロール錠10mg「サワイ」	○		8		ハ
	カルボシステインDS50%「タカタ」	○		8		製
	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	○		8		ハ
	カレトラ配合錠	×				ハ
	カロナール細粒50%	○		8		ハ
	カロナール錠200 200mg	○		8		ハ
	カンデサルタンOD錠8mg「EE」	○		8		製
	キックリンカプセル250mg	○		8	チューブ先に残渣あり	製
	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	○		8		製
	グーフィス錠5mg	○		8		東
	クエチアピン細粒10%「アメル」	○		8		製
	クエチアピン錠25mg「トーワ」	○		8		ハ
	クエチアピン錠100mg「トーワ」	○		8		ハ
	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg	△	破壊	8		東
	グラジナ錠50mg	－			データなし	製
	グラセプターカプセル0．5mg	○		8		東
	グラセプターカプセル1mg	－			データなし	製
カ	グラセプターカプセル5mg	－			データなし	製
	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636．5mg	－			データなし	
	グラマリール錠50mg	△	破壊	8		ハ
	クラリスロマイシンDS10%「MEEK」 100mg	○		8		製
	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	○		8		ハ

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	グランダキシン錠50　50mg	○		8		ハ
	グリクラジド錠40mg「NP」	○		8		ハ
	グリチロン配合錠	△	粉砕	8		ハ
	グリメピリドOD錠0．5mg「EMEC」	○		8		ハ
	グリメピリドOD錠1mg「EMEC」	○		8		ハ
	グルファストOD錠10mg	○		8		東
	クレメジン細粒分包2g	○		8	分散性不良	ハ
	クロザリル錠25mg	－			データなし	
	クロザリル錠100mg	－			データなし	
	クロピドグレル錠25mg「サワイ」	△	破壊	8		製
	クロピドグレル錠75mg「杏林」	△	破壊	8		製
	d－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」	×			徐放性	
	ケイキサレートドライシロップ76％	○		8		東
	ケーワン錠5mg	○		8		ハ
	ケトチフェンドライシロップ0．1％「タイヨー」	○		8		製
	ゲンボイヤ配合錠	○			通過のデータなし	製
	コートリル錠10mg	○		8		ハ
	コスパノン錠80mg	○		8		ハ
	コペガス錠200mg	△	破壊	8		東
	コララン錠2．5mg	△	破壊	8	15minで投与可(製薬会社回答)	
	コララン錠5mg	△	破壊	8	→破壊にて対応	
	コララン錠7．5mg	△	破壊	8		
	コルヒチン錠0．5mg「タカタ」	○		8		東
	コレアジン錠12．5mg	○		8		製
	コレバインミニ83％	×				
	コンサータ錠18mg	×			徐放性	製
	コンサータ錠27mg	×			徐放性	製
	コントミン糖衣錠12．5mg	△	破壊	8		ハ
	コントミン糖衣錠25mg	△	破壊	8		ハ
	コントミン糖衣錠50mg	△	破壊	8		ハ
	サーティカン錠0．25mg	－			データなし	ハ
	サーティカン錠0．5mg	－			データなし	ハ
	ザイザル錠5mg	○		8		ハ
	サイトテック錠100　100μg	○		8	催奇形性あり	ハ
	サインバルタカプセル20mg	×			腸溶性コーティング顆粒	ハ
	サインバルタカプセル30mg	×			腸溶性コーティング顆粒	ハ
	サムスカOD錠7．5mg	○		8		東
	ザルティア錠5mg	○		8		製
	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	△	破壊	8		ハ
	サワシリン細粒10％　100mg	○		8		ハ
	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	○		8		ハ
	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	○		8		ハ
	サンリズムカプセル50mg	○		8	局所麻酔作用	ハ
	ジアゾキシドカプセル25mg	－			データなし	製
	ジェイゾロフトOD錠25mg	○		8		東
	ジェイゾロフトOD錠50mg	○		8		東
	ジェニナック錠200mg	○		8		東
	シクレスト舌下錠5mg	×			舌下錠のため	製
	シクレスト舌下錠10mg	×			舌下錠のため	製
	ジクロフェナクNa徐放カプセル37．5mg「トーワ」	×				ハ
	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	○		8		ハ
	ジゴシン散0．1％	○		8		東
	ジスロマックカプセル小児用100mg	○		8		ハ
	ジスロマック錠250mg	○		8		ハ
	ジスロマック錠600mg	○		8		ハ
	リン酸ジヒドロコデイン散1％「ホエイ」	○		8		東
	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」	○		8		ハ
	シベノール錠50mg	○		8		ハ
	ジャディアンス錠10mg	－			データなし	製
	ジャディアンス錠25mg	－			データなし	製
	ジャドニュ顆粒分包360mg	－			データなし	製
	ジャドニュ顆粒分包90mg	○		8		東
	ジャヌビア錠50mg	○		8		東
	シュアポスト錠0．5mg	○		8		東
	臭化カリウム	－			データなし(水に容易に溶ける)	製
	重カマ「ヨシダ」	×		8	分散性不良	ハ
	ジラゼプ塩酸塩錠100mg「トーワ」	△	破壊	8		ハ
	シルニジピン錠10mg「サワイ」	○		8		ハ
	ジレニアカプセル0．5mg	－			データなし	
	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	○		8		ハ
	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	○		8		製
	シングレアチュアブル錠5mg	－			データなし	製
	シンメトレル細粒10％	○		8		ハ
サ	シンメトレル錠50mg	○		8		ハ
	スインプロイク錠0．2mg	○		8		東
	スタリビルド配合錠	△	破壊	8		服
	スタレボ配合錠L50	△	破壊	8		東
	スタレボ配合錠L100	△	破壊	8		東
	ストックリン錠600mg	×				ハ
	ストラテラカプセル40mg	－			データなし	製
	ストロメクトール錠3mg	○		8		ハ
	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	○		8		ハ
	スピロペント錠10μg	○		8		ハ
	ズファジラン錠10mg	○		8		ハ
	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	○		8		ハ
	スルピリド細粒50％「アメル」	×				ハ
	スルピリド錠50mg「アメル」	○		8		ハ
	ゼチーア錠10mg	○		8		東
	セパミットーR細粒2％	○		8	分散性不良	ハ
	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	○		8		ハ
	セファクロル細粒小児用10％「サワイ」　100mg	○		8		ハ
	セファランチン錠1mg	○		8		ハ

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	ゼフィックス錠100　100mg	○		8		ハ
	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100r	○		8		ハ
	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	△	破壊	8		ハ
	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 100mg	○		8		ハ
	セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	○		8		ハ
	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg	○		8		ハ
	セフジニル錠100mg「サワイ」	○		8		ハ
	セララ錠50mg	○		8		ハ
	セリンクロ錠10mg	－			データなし	製
	セルシン散1%	○		8		ハ
	2mgセルシン錠	○		8		ハ
	セルセプトカプセル250　250mg	○		8		東
	ゼルヤンツ錠5mg	○		8		製
	セレコックス錠100mg	○		8		東
	セレスタミン配合錠	○		8		ハ
	セレニカR錠200mg	×			徐放性	ハ
	セレニカR顆粒40%	×			徐放性	ハ
	セロケン錠20mg	○		8		ハ
	ゼンタコートカプセル3mg	×				東
	センノサイド顆粒8%「EMEC」	○		8		ハ
	センノシド錠12mg「トーワ」	△	粉砕	8		ハ
	ゾテピン錠50mg「ヨシトミ」	○		8		製
	ソバルディ錠400mg	○			通過のデータなし	製
	ゾフルーザ錠10mg	○		8		東
	ゾフルーザ錠20mg	○		8		東
	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	○		8		ハ
	ダイアモックス錠250mg	○		8		ハ
	ダイフェン配合錠	○		8		ハ
	ダイフェン配合顆粒	○		8		ハ
	タウリン散98%「大正」	○		8	分散性不良	ハ
	タケキャブ錠10mg	○		8		東
	タケキャブ錠20mg	○		8		東
	タナトリル錠5　5mg	△	破壊	8		ハ
	ダフクリア内服錠200mg	○		－	通過のデータなし	製
	タフマックE配合カプセル	×				製
	タムスロシン塩酸塩OD錠0．2mg「トーワ」	○		8		ハ
	ダラシンカプセル150mg	○		8		ハ
	タリージェ錠2．5mg	○		8		東
	タリージェ錠5mg	○		8		東
	タリージェ錠10mg	○		8		東
	タリージェ錠15mg	○		8		東
	タリオンOD錠10mg	○		8		東
	タルチレリンOD錠5mg「アメル」	○		8		ハ
	炭酸水素ナトリウム　シオエ	○		8	1回量多ければ溶解の水を増やす	ハ
	炭酸リチウム錠100mg	△	破壊	8		ハ
	炭酸リチウム錠200mg	△	破壊	8		ハ
	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	○		8		ハ
	ダントリウムカプセル25mg	○		8		ハ
	タンニン酸アルブミン　シオエ	○		8		ハ
	タンボコール錠50mg	○		8		ハ
	チウラジール錠50mg	○		8		ハ
	チガソンカプセル10　10mg	○		8	曝露	ハ
	チザニジン錠1mg「アメル」	－			データなし	製
	チラーヂンS散0．01%	○		8		東
	チラーヂンS錠50μg	○		8		ハ
	25mcgチロナミン錠　25μg	○		8		ハ
	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	○		8	三和	ハ
	つくしA・M配合散	×			水に不溶	製
	ツベルミン錠100mg	×			吸湿性	ハ
	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（3g/包）	○		8		ハ
	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）（3g/包）	○		8		ハ
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
タ	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	○		8		ハ
	ツルバダ配合錠	△	破壊	8		ハ
	ディナゲスト錠1mg	○		8		ハ
	テオドールドライシロップ20%	○		8		東
	テオドール錠100mg	×			徐放性、粉砕不可	ハ
	テオドール錠200mg	×			徐放性、粉砕不可	ハ
	デカドロン錠0．5mg	○		8		東
	デカドロン錠4mg	○		8		東
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	○		8		ハ
	テグレトール細粒50%	○		8		ハ
	テグレトール錠200mg	○		8		ハ
	デシコビ配合錠LT	×	水		通過のデータなし	製
	デシコビ配合錠HT	×	水		通過のデータなし	製

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	テトラミド錠10mg	○		8		ハ
	テトラミド錠30mg	○		8		ハ
	テネリア錠20mg	○		8		東
	テノーミン錠50　50mg	○		8		ハ
	テノゼット錠300mg	○		8		製
	デノタスチュアブル配合錠	○		8		東
	テビケイ錠50mg	－			データなし	製
	テプレノン細粒10%「トーワ」	○		8		ハ
	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	○		8		ハ
	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	○		8		東
	トアラセット配合錠「DSEP」	△	破壊	8		製
	ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	○		8		ハ
	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg	○		8		ハ
	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg	○		8		ハ
	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg	○		8		ハ
	ドパコール配合錠L100	○		8		製
	ドパストン散98．5%	○		8		ハ
	トピナ錠50mg	○		8		東
	トピナ錠100mg	○		8		東
	ドプスOD錠100mg	○		8		東
	トフラニール錠25mg	×				ハ
	トラクリア錠62．5mg	○		8		東
	トラセミドOD錠4mg「TE」	○		8		東
	トラゼンタ錠5mg	○		8		東
	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	△	破壊	8		ハ
	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	△	破壊	8		ハ
	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	○		8		ハ
	トラベルミン配合錠	○		8		ハ
	トラマールOD錠25mg	○		8		東
	トラマールOD錠50mg	○		8		東
	トランサミン散50%	○		8		東
	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	○		8		ハ
	トリプタノール錠10　10mg	○		8		ハ
	トリンテリックス錠10mg	○		8		製
	トレリーフOD錠25mg	○		8		ハ
	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10，000単位1g	○		8		ハ
ナ	ナウゼリンOD錠10　10mg	○		8		東
	ナゼアOD錠0．1mg	○		8		ハ
	ナトリックス錠1　1mg	△	破壊	8		製
	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	○		8		ハ
	ニコランジル錠5mg「トーワ」	○		8		
	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	△	破壊	8		ハ
	ニトロールRカプセル20mg	×			徐放性	ハ
	ニトロペン舌下錠0．3mg	×			舌下投与	
	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	×			徐放性	ハ
	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	×			徐放性	ハ
	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	×			徐放性	ハ
	乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	○		8		ハ
	ニューレプチル細粒10%	○		8		ハ
	ネオーラル10mgカプセル	○		8		ハ
	ネオーラル25mgカプセル	○		8		ハ
	ネオーラル50mgカプセル	○		8		ハ
	ネオドパゾール配合錠	○		8		製
	ネキシウムカプセル20mg	○		8		東
	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	○	水			東
	ネシーナ錠25mg	○		8		東
	ノイエル細粒40%	○		8	分散性不良	ハ
	ノイロトロピン錠4単位	×				ハ
	ノイロビタン配合錠	○		8		東
	ノウリアスト錠20mg	○		8	光に不安定	製
	ノービア錠100mg	○		8		
	ノバミン錠5mg	○		8		ハ
	ノベルジン錠50mg	○		8		製
	ノリトレン錠25mg	○		8		ハ
	パーキネス錠2　2mg	○		8		ハ
	ハーフジゴキシンKY錠0．125　0．125mg	○		8		東
	ハーボニー配合錠	○		－	通過のデータなし	製
	バイアスピリン錠100mg	×		8	胃腸障害注意	ハ
	ハイシー顆粒25%	○		8		ハ
	パキシルCR錠12．5mg	×			徐放性、粉砕不可	
	パキシルCR錠25mg	×			徐放性、粉砕不可	
	パキシル錠10mg	○		8		ハ
	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	△	粉砕	8		製
	バリキサ錠450mg	○		8		東
	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	○		8		
	バルトレックス顆粒50%	×			代替→錠剤の粉砕	ハ
	バルネチール細粒50%	－			データなし	製
	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	×			徐放性、粉砕不可	ハ
	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	×			徐放性、粉砕不可	ハ
	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	○		8		製
	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	×		12	12Fr.より投与可	ハ
	ハロペリドール細粒1%「アメル」	○		8		ハ
	ハロペリドール錠0．75mg「アメル」	○		8		ハ
	ハロペリドール錠1．5mg「アメル」	○		8		ハ
	ハロペリドール錠3mg「アメル」	○		8		ハ
	パントシン散20%	○		8	分散性不良	ハ
	調剤用パンビタン末	○		8		東
	PL配合顆粒	○		8		ハ
	ビ・シフロール錠0．125mg	○		8		東
	ビ・シフロール錠0．5mg	○		8		東
	ピーゼットシー糖衣錠8mg	○		8		ハ

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	ピートルチュアブル錠250mg	○		8		
	ピートルチュアブル錠500mg	○		8		
	ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」	○		8		ハ
	ビオフェルミンR散	○	水	8	温湯による生菌数低下の可能性あり	ハ
	ビオフェルミン配合散	○	水	8		ハ
	ビオプテン顆粒2．5%　0．4g	○		8		製
	ビクタルビ配合錠	－			データなし	
	ビジクリア配合錠	×			P上昇の可能性	製
	ビソプロロールフマル酸塩錠0．625mg「トーワ」	○		8		ハ
	ビソプロロールフマル酸塩錠2．5mg「トーワ」	○		8		ハ
	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」	○		8		ハ
	ビソルボン細粒2%	○		8		ハ
	ビソルボン錠4mg	○		8		ハ
	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	○		8		
	ビタミンB6散10%「マルイシ」	○		8		製
	ビタメジン配合カプセルB25	○		8		ハ
	ヒダントールF配合錠	○		8		ハ
	ピドキサール錠20mg	×		8	腸溶錠	ハ
	ビビアント錠20mg	○		8		東
	ビプレッソ徐放錠50mg	×			徐放性、粉砕不可	
	ビプレッソ徐放錠150mg	×			徐放性、粉砕不可	
	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	○		8		製
	ヒベルナ散10%	△		8	シリンジ内にわずかな固形物の付着および残	製
	ビムパットドライシロップ10%	○		8		製
	ビムパット錠50mg	○				東
	ビムパット錠100mg	○		8		東
	ピモベンダン錠2．5mg「TE」	○				東
	ビラノア錠20mg	○		8		東
	ピラマイド原末	○		8		ハ
	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	○		8	局所麻酔作用	製
	ビルトリシド錠600mg	○		8		ハ
	ヒルナミン細粒10%	○		8		ハ
	ヒルナミン錠5mg	○		8		ハ
	ヒルナミン錠25mg	○		8		ハ
	ピレスパ錠200mg	○		8		ハ
	ピレチア錠（25mg）	○		8		ハ
	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	○		8		ハ
	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	○		8		ハ
	ファモチジン散10%「サワイ」	○		8	サワイ	ハ
	ファロム錠200mg	×		×	溶け残りあり閉塞の可能性。14Frで△	東
	フィコンパ錠4mg	○		8		東
	フィコンパ錠4mg	○		8		東
	ブイフェンド錠50mg	○		8		東
	ブイフェンド錠200mg	△	破壊	8		東
	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」	○		8		
	フェノバルビタール散10%「マルイシ」	○		8		製
	フェブリク錠10mg	○		8		ハ
	フェブリク錠20mg	○		8		ハ
	フェブリク錠40mg	○		8		ハ
	フェリセルツ散20%　600mg	×			データなし	
	フェロ・グラデュメット錠105mg	×				ハ
ハ	フェロミア顆粒8．3%	○		8		ハ
	フォリアミン錠　5mg	○		8		ハ
	ブシラミン錠50mg「トーワ」	△	破壊	8	吸湿性	ハ
	ブスコパン錠10mg	○		8		ハ
	ブライアン錠500mg	×			腸溶錠	製
	プラケニル錠200mg	△	破壊			製
	プラザキサカプセル75mg	×			AUC上昇	東
	プラザキサカプセル110mg	×			AUC上昇	東
	フラジール内服錠250mg	×		14	粉砕し、14Frでなら投与可	東
	ブラダロン錠200mg	×		8	溶け残りあり閉塞の可能性。	ハ
	ブラニュート配合顆粒　4．73g	×				ハ
	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	○		8		ハ
	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	○	破壊	8		ハ
	プランルカストDS10%「トーワ」	○		8		製
	プランルカストカプセル112．5mg「トーワ」	○		8		ハ
	プリジスタナイーブ錠800mg	○		8		東
	フリバスOD錠50mg	○		8		ハ
	フリバスOD錠75mg	○		8		ハ
	プリモボラン錠5mg	○		8		ハ
	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	－			データなし	製
	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	×			崩壊せず詰まる。	製
	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	○		8		ハ
	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	○		8		ハ
	プレドニゾロン散「タケダ」1%	○		8		ハ
	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	○		8		ハ
	プレドニン錠5mg	○		8		ハ
	プレバイミス錠240mg	－			データなし	
	プレマリン錠0．625mg	×			吸湿性、通過性不良	ハ
	プロ・バンサイン錠15mg	○		8		ハ
	プログラフカプセル0．5mg	○		8		ハ
	プログラフカプセル1mg	○		8		ハ
	プログラフ顆粒0．2mg	○		8		東
	プロスタグランジンE2錠0．5mg「科研」	－			データなし	製
	プロセキソール錠0．5mg	×			腸溶錠	
	フロセミド細粒4%「EMEC」	○		8		ハ
	フロセミド錠20mg「NP」	○		8		ハ
	フロセミド錠40mg「NP」	○		8		ハ
	プロタノールS錠15mg	×				ハ
	ブロチゾラムOD錠0．25mg「アメル」	○		8		ハ
	プロテカジンOD錠10　10mg	○		8		ハ
	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	○		8		東

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	プロノン錠150mg	○		8		ハ
	塩酸プロピベリン錠10mg「SW」	○		8		ハ
	フロベン顆粒8％	－			錠剤は可	製
	フロリネフ錠0．1mg	○		8		東
	ベサコリン散5％	○		8		ハ
	ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	×		×	徐放性	ハ
	ベシケアOD錠5mg	○		8	OD	東
	ベタニス錠50mg	×		×	徐放性	東
	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」	○		8		ハ
	ベタメタゾン錠0．5mg「サワイ」	○		8		ハ
	塩酸ベニジピン錠2「MEEK」 2mg	△	破壊	8		ハ
	ヘプセラ錠10 10mg	○		8	吸湿性	ハ
	ベプリコール錠50mg	○		8		ハ
	ベムリディ錠25mg	○		－	通過のデータなし	製
	ペラゾリン細粒400mg	×			可能だが曝露注意	ハ
	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	○		8		ハ
	ベリチーム配合顆粒	×				ハ
	ペルサンチン錠25mg	○		8		ハ
	ベルソムラ錠10mg	△	破壊	8		
	ベルソムラ錠15mg	△	破壊	8		東
	ベルソムラ錠20mg	△	破壊	8		東
	ヘルベッサーRカプセル100mg	×		×		ハ
	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	○		8		ハ
	ベンザリン細粒1％	○		8		ハ
	ベンザリン錠5 5mg	○		8		東
	ベンザリン錠10 10mg	○		8		ハ
	ペンタサ顆粒94％	×			製剤特性	ハ
	ホクナリンドライシロップ0．1％小児用	○		8		東
	ボグリボースOD錠0．3mg「トーワ」	○		8		ハ
	ホスミシンドライシロップ400 400mg	○		8		東
	ホスミシン錠500 500mg	○		8		ハ
	ホスリボン配合顆粒 100mg（リンとして）	○		8		東
	ホスレノールOD錠250mg	○		8		東
	ボナロン経口ゼリー35mg	○		8		ハ
	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	○		8		ハ
	ポリカルボフィルCa細粒83．3％「日医工」	×				ハ
	ホリゾン錠5mg	○		8		東
	ボンゾール錠100mg	○		8		ハ
マ	マイスタン細粒1％	○		8		
	マイテラーゼ錠10mg	○		8		ハ
	マヴィレット配合錠	×				製
	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	○		8		OD
	ミコンビ配合錠BP	○		8		製
	ミゾリビン錠50mg「サワイ」	×		×	198℃ 15分で通過する	ハ
	ミティキュアダニ舌下錠3，300JAU	－			舌下錠	
	ミニリンメルトOD錠60μg	○		8		
	ミニリンメルトOD錠120μg	○		8		
	ミネブロ錠2．5mg	○		8		東
	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	○		8		ハ
	ミノマイシン顆粒2％ 20mg	○		8		ハ
	ミヤBM細粒	○		8		東
	ミヤBM錠	○		8		製
	ミラペックスLA錠0．375mg	×			徐放性	東
	ミラペックスLA錠1．5mg	×			徐放性	東
	ミルタザピン錠15mg「明治」	○		8		東
	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」	○		8		ハ
	ムコサールドライシロップ1．5％	－			データなし	製
	ムルプレタ錠3mg	－			データなし	製
	メイラックス錠1mg	○		8		ハ
	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	○		8		ハ
	メコバラミン錠500「トーワ」 0．5mg	△	破壊	8		ハ
	メサラジン腸溶錠400mg「KN」	×			腸溶錠	ハ
	メスチノン錠60mg	○		8		ハ
	メタルカプターゼカプセル100mg	○		8		ハ
	メチコバール細粒0．1％ 500mg	○		8		ハ
	メチルエルゴメトリン錠0．125mg「あすか」	○		8	光で着色	ハ
	メチルジゴキシン錠0．1mg「タイヨー」	○		8		ハ
	メトグルコ錠250mg	○		8		東
	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	○		8		
	メトピロンカプセル250mg	○		8	時間をかければ 軟カプセル	ハ
	メトリジンD錠2mg	○		8		ハ
	メドロール錠2mg	○		8		ハ
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2．5mg「F」	△	破壊	8		製
	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」	○		8	光で分解	ハ
	メファキン「ヒサミツ」錠275 275mg	－			データなし	
	メマリーOD錠5mg	○		8	OD	東
	メマリーOD錠10mg	○		8	OD	東
	メマリーOD錠20mg	○		8	OD	東
	メルカゾール錠5mg	×		×		ハ
	モービック錠10mg	○		8		東
	モディオダール錠100mg	－			データなし	製
	モビコール配合内用剤 6．8523g	○		8		東
	モンテルカストOD錠10mg「KN」	○		8		
	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	○		8	フラッシュ必要	製
ヤ	ヤーズ配合錠	－			データなし	
	ユーエフティE配合顆粒T150 150mg（テガフール相当量）	×				東
	ユーゼル錠25mg	○		8		ハ
	ユービット錠100mg	○		8	粉砕不可	ハ
	ユーロジン2mg錠	○		8		ハ
	ユナシン細粒小児用10％ 100mg	×			18Fr.	ハ
	ユベラNカプセル100mg	○		8		ハ
	ユベラ錠50mg	×		×	光	ハ

	医薬品名	可否（○△×）	△条件	最少通過Fr	備考	情報源
	ユリノーム錠50mg	○		8		ハ
	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	－			データなし	製
	ラグノスNF経口ゼリー分包12g　54．167%	○		8	ｾﾞﾘｰの残りあるが通過性○	製
	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	×		×	腸溶性	ハ
	ラボナ錠50mg	○		8		ハ
	ラミクタール錠25mg	○		8		ハ
	ラミクタール錠100mg	○		8		ハ
	ラミクタール錠小児用2mg	○		8		ハ
	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	○	水	8	水で溶解、直ちに投与	ハ
	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	○	水	8	水で溶解、直ちに投与	ハ
	リアルダ錠1200mg　1，200mg	×		×	放出制御製剤	東
	リーゼ錠5mg	○		8	光	ハ
	リーマス錠200　200mg	△	破壊		胃腸障害注意	ハ
	リウマトレックスカプセル2mg	○		8		ハ
	リオナ錠250mg	○		8		東
	リオレサール錠5mg	○		8		ハ
	リクシアナOD錠30mg	○		8		製
	リクシアナOD錠60mg	○		8		製
	リザベンカプセル100mg	○		8		ハ
	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	○		8		ハ
	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	○		8		ハ
	リスペリドン細粒1%「トーワ」	○		8		ハ
	リスミー錠1mg	○		8		ハ
	リズミック錠10mg	○		8		ハ
	リタリン錠10mg	○		8		ハ
	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	○		8		ハ
	リネゾリド錠600mg「サワイ」	○		8		製
	リパクレオンカプセル150mg	×			腸溶性	製
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	○		8		ハ
	リフキシマ錠200mg	○		8		東
	リボトリール細粒0．1%	○		8		ハ
	リボトリール錠0．5mg	○		8		ハ
	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	○		8		ハ
	リリカOD錠25mg	○		8		製
	リリカOD錠75mg	○		8		製
	リリカOD錠150mg	○		8		製
	リルゾール錠50mg「タナベ」	△	破壊	8		ハ
	リンゼス錠0．25mg	○		8		東
ラ	ルーラン錠4mg	○		8		ハ
	ルジオミール錠25mg	○		8	苦味、舌麻痺	ハ
	ルナベル配合錠LD	×		×	データなし	
	ルネスタ錠1mg	×		×	懸濁液中類緑物質増加規格外	ハ
	レキサルティ錠1mg	○		8		東
	レキサルティ錠2mg	○		8		ハ
	レキソタン錠2　2mg	○		8		ハ
	レキップCR錠2mg	×		×	徐放錠	ハ
	レキップCR錠8mg	×		×	徐放錠	ハ
	レクサプロ錠10mg	○		8		
	レクシヴァ錠700　700mg	△	破壊	8		ハ
	レクチゾール錠25mg	○		8		ハ
	レグテクト錠333mg	×			腸溶錠	
	レグナイト錠300mg	×			徐放性	製
	レグパラ錠12．5mg	○		8		東
	レダマイシンカプセル150mg	○		8		ハ
	レナジェル錠250mg	○		8		東
	レバチオ錠20mg	○		8		東
	レバミピド錠100mg「Me」	○		8		ハ
	レバミピド顆粒20%「日医工」	×		12	12Fr.より投与可	ハ
	レベトールカプセル200mg	×		△	催奇形性あり　暴露防止策が必要	東
	レボフロキサシンOD錠250mgトーワ	△	破壊	△		ハ
	レボレード錠12．5mg	－			データなし	
	レミッチOD錠2．5μg	○		8		製
	レミニールOD錠4mg	○		8		
	レミニールOD錠8mg	○		8		
	レルパックス錠20mg	○		8		製
	レルミナ錠40mg	○		8		製
	ロイケリン散10%	○		8	メルカプトプリン	ハ
	ロイコン錠10mg	○		8		ハ
	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	△	破壊	8		ハ
	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	△	破壊	8		ハ
	ロスバスタチンOD錠2．5mg「サワイ」	○		8	OD	
	ロゼレム錠8mg	○		8		東
	ロペラミド錠1mg「EMEC」	○		8		ハ
	ロラゼパム錠0．5mg「サワイ」	○		8		ハ
	ロラタジンOD錠10mg「AA」	○		8		ハ
	ワーファリン錠1mg	○		8		ハ
	ワーファリン顆粒0．2%	○		8		ハ
ワ	ワゴスチグミン散（0．5%）	○		8		ハ
	ワソラン錠40mg	△	破壊	8		ハ
	ワントラム錠100mg	×			徐放性	東

2020年3月作成　呉医療センター薬剤部