

呉医療センター採用医薬品 簡易懸濁可否一覧表

【可否】 ○:可(8Fr/10分以内)、△:条件付きで可、×:不可

【条件】 破壊(錠剤のフィルムコーティングに亀裂を入れる)、水(水で懸濁)、○分(溶解に10分以上要す場合の溶解時間)⇒「△」

粉砕(粉状になるまでつぶす)⇒「×」

【最小通過Fr】 8Fr以下⇒「○」 8Fr超⇒「×」

【曝露注意】 曝露注意の記載のある薬剤を簡易懸濁にて投与する場合は薬剤師にご相談ください。

※後発品はメーカーにより可否・条件が異なる場合があります。

※腸溶錠はカテーテルの先が腸内であれば投与可能です。

医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
アイセントレス錠400mg	×		-	破壊にて懸濁可能。通過性不明。
アイトロール錠20mg	○		8	
アキネトン細粒1%	○		8	分散性不良
アグリリンカプセル0.5mg	×			データなし
アコファイド錠100mg	○		8	
アザルフィジンEN錠500mg	×		8	腸溶錠(カ)先腸内→病棟破壊で可)
アジルバ錠20mg	○		8	
アジレクト錠0.5mg	×			データなし
アジレクト錠1mg	×			データなし
アスパラカリウム散50%	×			凝集性あり。水で溶解しフラッシュ2回必要
アスパラカリウム錠300mg	△	直前破壊	8	水で懸濁
L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	×		12	
アスピリン「ホエイ」	○		8	
アスペノンカプセル10 10mg	○		8	局所麻酔作用
アスペリン散10%	○		8	
アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」	○		8	
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	○		8	
アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	△	破壊	8	
アゾセミド錠30mg「JG」	○		8	
アダブチノール錠5mg	×			光、酸素に不安定
アタラックス-Pカプセル25mg	○		8	
アデホスコーフ顆粒10%	×		18	
アドソルビン原末	○		8	分散性不良
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	○		8	
アナフラニール錠25mg	△	破壊	8	
アビガン錠200mg	○		8	
10%アプレゾリン散「SUN」	○		8	
アボルブカプセル0.5mg→後発切替予定	×			難溶性・曝露
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	○		8	
アミティーザカプセル24 μg	○		8	軟カプセル
アミノレバンEN配合散	×		12	
アミノレバンEN配合散(50g/包)(フルーツ味)	×		12	
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	○		8	
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	○		8	
アモキサシリンカプセル25mg	○		8	
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	○		8	
アラバ錠10mg	×			データなし
アルギU配合顆粒	○		8	
アルサルミン細粒90%	○		8	
アルダクトンA細粒10%	○		8	
アルドメット錠250 250mg	○		8	
アルファカルシドール錠0.5 μg「アメル」	△	破壊	8	
アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	○		8	
アレジオンドライシロップ1%	○		8	
アレビアチン散10%	○		8	錠剤も○
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	○		8	
アローゼン顆粒	×		14	代替:センノサイド顆粒
アロチノール塩酸塩錠5mg「日医工」	○		8	
アロチノール塩酸塩錠10mg「日医工」	○		8	
アロプリノール錠100mg「杏林」	○		8	
安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	○		8	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	○		8	
イーケプラドライシロップ50%	○		8	
イーケプラ錠250mg	○		8	
イーケプラ錠500mg	○		8	
イグザレルト錠10mg	○		8	
イグザレルト錠15mg	○		8	
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	○		8	
イスコチン原末	○		8	
イスコチン錠100mg	○		8	光・防湿
イトラコナゾール錠50「科研」 50mg	○		8	
EPLカプセル250mg	×			油状
イフェクサー-SRカプセル37.5mg	×			徐放性
イフェクサー-SRカプセル75mg	×			徐放性
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	×			
イミグラン錠50 50mg	○		8	
イムラン錠50mg	○		8	曝露注意
イメンドカプセル80mg	○		8	
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	○		8	
イリボーOD錠2.5 μg	○		8	
インヴェガ錠3mg	×			徐放性
インヴェガ錠6mg	×			徐放性
インチュニブ錠1mg	×			徐放性
インチュニブ錠3mg	×			徐放性
インデラル錠10mg	○		8	遮光
ヴァンフリタ錠17.7mg	△	60分で崩壊	8	抗がん剤曝露注意
ヴァンフリタ錠26.5mg	△	60分で崩壊	8	抗がん剤曝露注意
ウインタミン細粒(10%)	○		8	
ヴォリブリス錠2.5mg	×			データなし
ウプトラビ錠0.2mg	○		8	
ウプトラビ錠0.4mg	○		8	
ウブレチド錠5mg	○		8	
ウラリット-U配合散	○		8	
ウリアデック錠20mg	○		8	

医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
ウリアデック錠40mg	○		8	
ウリアデック錠60mg	○		8	
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	○		8	
ウルソ顆粒5%	○		8	
エースコール錠2mg	○		8	
エカード配合錠HD	○		8	
エクア錠50mg	○		8	
エクセグラン散20%	○		8	
エクセグラン錠100mg	○		8	
エクフィナ錠50mg	△	破壊	8	
エストリール錠1mg(持田)	○		8	曝露注意
エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	△	水	8	55°Cの場合残存わずかに有り
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	○		8	
エチゾラム錠1mg「EMEC」	○		8	
エディロールカプセル0.75μg→後発切替予定	○		8	
エトドラク錠200mg「トーワ」	○		8	
エナラプリルM錠5「EMEC」5mg	○		8	
エバステチンOD錠10mg「日医工」	○		8	
エバミール錠1.01mg	○		8	
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	△	破壊	8	
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	○		8	
エビプロスタット配合錠DB	×			腸溶性
エビリファイOD錠12mg	○		8	
エビリファイ錠6mg	○		8	
エピレオプチマル散50%	△	水	8	融点:48°C
エフィエントOD錠20mg	○		8	
エフィエント錠3.75mg	△	水	8	55°Cで含量低下
エプクルーサ配合錠	×		-	通過のデータなし
エプジコム配合錠	△	破壊	8	
エプトール250mg錠	△	破壊	8	吸湿、病棟にて破壊(エサンプトール参照)
エフビーOD錠2.5 2.5mg	○		8	
エブランチルカプセル15mg	○		8	
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	△	破壊	8	
エリキユース錠2.5mg	○		8	
エリキユース錠5mg	○		8	
エルカルチンFF錠100mg	△	破壊	8	
エルカルチンFF錠250mg	△	破壊	8	
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	△		8	残存あり
エレルサ錠50mg	×			データなし
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	○		5	1kcal/ml(2kcal/ml→10Fr)
エレンタール配合内用剤	○		5	1kcal/ml(2kcal/ml→10Fr)
塩化カリウム「日医工」	○		8	
塩化ナトリウム「オーツカ」	○		8	
エンタカボン錠100mg「アメル」	○		8	
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	○		8	
エンレスト錠50mg	×			データなし
エンレスト錠100mg	×			データなし
エンレスト錠200mg	×			データなし
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	○		8	
オーラップ細粒1%	×			データなし、錠剤は可
オゼックス細粒小児用15% 150mg	○		8	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	○		8	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	△		8	カプセル剤皮付着恐れあり注意
オフエブカプセル100mg	×			難溶性・曝露
オフエブカプセル150mg	×			難溶性・曝露
オラベネム小児用細粒10% 100mg	○		8	
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	○		8	
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	○		8	
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	○		8	
オランザピン細粒1%「トーワ」	○		8	
オルケディア錠1mg	○		8	
オルケディア錠2mg	○		8	
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	○		8	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	○		8	
オングリザ錠5mg	○		8	
ガスコン錠40mg	○		8	
ガスマチン散1%	○		8	
ガスマチン錠5mg	○		8	
ガスター散2%	○		8	
カタプレス錠75μg 0.075mg	○		8	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	○		8	
ガバペン錠200mg	△	破壊	8	
ガバペン錠300mg	△	破壊	8	
カプトリル錠12.5mg	○		8	
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	△	14分で崩壊	8	
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」1mg	○		8	
カボメティクス錠20mg	○		8	抗がん剤曝露注意
カボメティクス錠60mg	○		8	抗がん剤曝露注意
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	○		8	
ガランターゼ散50%	△	水	8	50°C以下で懸濁(55°Cで分解)
ガランタミンOD錠4mg「アメル」	○		8	
ガランタミンOD錠8mg「アメル」	○		8	
ガランタミンOD錠12mg「アメル」	○		8	
カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」	×			腸溶性製剤
カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」	×			データなし
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」	×			データなし
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	○		8	
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	○		8	
カルベジロール錠10mg「サワイ」	○		8	
カルボシステインDS50%「タカタ」	○		8	
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	○		8	
カレトラ配合錠	×			
カロナール細粒50%	○		8	
カロナール錠200 200mg	○		8	
カンデサルタンOD錠8mg「EE」	○		8	

	医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
カ	キックリンカプセル250mg	○		8	チューブ先に残渣あり
	キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	○		8	
	キャピリン配合錠	×			データなし
	ゲーフィス錠5mg	○		8	
	クエチアピン細粒10%「アメル」	○		8	
	クエチアピン錠25mg「トーワ」	○		8	
	クエチアピン錠100mg「トーワ」	○		8	
	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 鉄50mg	△	破壊	8	代替:フェロミア顆粒
	グラジナ錠50mg	×			データなし
	グラセプターカプセル0.5mg	○		8	
	グラセプターカプセル1mg	×			データなし
	グラセプターカプセル5mg	×			データなし
	クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg	×			データなし
	グラマリール錠50mg	△	破壊	8	
	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg	○		8	
	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	○		8	
	グランダキシン錠50 50mg	○		8	
	グリクラジド錠40mg「NP」	○		8	
	グリチロン配合錠	×	粉碎	8	
	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	○		8	
	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	○		8	
	グルファストOD錠10mg	○		8	
	グレースビット錠50mg	○		8	
	クレメジン細粒分包2g	△		8	分散性不良(混合しながら)。閉塞リスク有。
	クレメジン速崩錠500mg	△		8	錠の試験なし。速やかに崩壊→細粒データ参照。
	クロザリル錠25mg	×			データなし
	クロザリル錠100mg	×			データなし
	クロピドグレル錠25mg「サワイ」	△	破壊	8	
	クロピドグレル錠75mg「杏林」	△	破壊	8	
	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」	×			徐放性
	ケイキサレートドライシロップ76%	○		8	
	ケーワン錠5mg	○		8	
	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」	○		8	
	ゲンボイヤ配合錠	×		-	通過のデータなし
	コートリル錠10mg	○		8	
	コスパノン錠80mg	○		8	
	コペガス錠200mg	△	破壊	8	曝露注意
	コラン錠2.5mg	△	破壊	8	15minで投与可(製薬会社回答)
	コラン錠5mg	△	破壊	8	→破壊にて対応
	コラン錠7.5mg	△	破壊	8	
	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	○		8	
	コレアジン錠12.5mg	○		8	
	コレバインミニ83%	×			
	コンサータ錠18mg	×			徐放性
	コンサータ錠27mg	×			徐放性
	コントミン糖衣錠12.5mg	△	破壊	8	
	コントミン糖衣錠25mg	△	破壊	8	
コントミン糖衣錠50mg	△	破壊	8		
サ	サーティカン錠0.25mg	×			データなし(チューブ吸着試験のみ実施)
	サーティカン錠0.5mg	×			データなし(チューブ吸着試験のみ実施)
	ザイザル錠5mg→後発切替予定	○		8	
	サイトテック錠100 100μg	○		8	曝露注意(催奇形性あり)
	サインバルタカプセル20mg	×			腸溶性コーティング顆粒
	サインバルタカプセル30mg	×			腸溶性コーティング顆粒
	サムスカOD錠7.5mg	○		8	
	ザルティア錠5mg→後発切替予定	○		8	
	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	△	破壊	8	
	サワシリン細粒10% 100mg	○		8	
	酸化マグネシウム	×		8	分散性不良
	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	○		8	
	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	○		8	
	サンリズムカプセル50mg	○		8	局所麻酔作用
	ジアゾキッドカプセル25mg	×			データなし
	ジェイゾフトOD錠25mg	○		8	
	ジェイゾフトOD錠50mg	○		8	
	ジェニナック錠200mg	○		8	
	シクレスト舌下錠5mg	×			舌下錠のため
	シクレスト舌下錠10mg	×			舌下錠のため
	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	×			徐放性
	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	○		8	
	ジゴシン散0.1%	○		8	
	ジスロマックカプセル小児用100mg	○		8	
	ジスロマック錠250mg	○		8	
	ジスロマック錠600mg	○		8	
	リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」	○		8	
	ジフェンドール塩酸塩錠25mg「日医工」	○		8	
	シベノール錠50mg	○		8	
	ジャディアンス錠10mg	×			データなし
	ジャディアンス錠25mg	×			データなし
	ジャドニュー顆粒分包360mg	×			データなし
	ジャドニュー顆粒分包90mg	○		8	
	ジャヌビア錠50mg	○		8	
	シュアポスト錠0.5mg→後発切替予定	○		8	
	臭化カリウム	×			データなし(水に容易に溶ける)
	重カマ「ヨシダ」	×		8	分散性不良
	重曹錠500mg「マイラン」	○		8	
	ジラゼブ塩酸塩錠100mg「トーワ」	△	破壊	8	
	シルニジピン錠10mg「サワイ」	○		8	
	ジレニアカプセル0.5mg	×			データなし
	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	○		8	
	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	○		8	
	シングルレアチュアブル錠5mg	×			データなし
	シンメトレル細粒10%	○		8	
	シンメトレル錠50mg	○		8	
	スインプロイク錠0.2mg	○		8	

医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
スタリビルド配合錠	△	破壊	8	
スタレボ配合錠L50	△	破壊	8	
スタレボ配合錠L100	△	破壊	8	
ストックリン錠600mg	×			
ストラテラカプセル40mg	×			データなし
ストロメクトール錠3mg	○		8	
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	○		8	
スピロベント錠10μg	○		8	
ズファジラン錠10mg	○		8	
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	○		8	
スルピリド細粒50%「アメル」	×			
スルピリド錠50mg「アメル」	○		8	
ゼチーア錠10mg→後発切替予定	○		8	
セパミット-R細粒2%	○		8	分散性不良
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	○		8	
セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 100mg	○		8	
セファランチン錠1mg	○		8	
ゼフィックス錠100 100mg	○		8	
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」 100mg	○		8	
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	△	破壊	8	
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 100mg	○		8	
セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」	○		8	
セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 100mg	○		8	
セフジニル錠100mg「サワイ」	○		8	
セララ錠50mg	○		8	
セリンクロ錠10mg	×			データなし
セルシン散1%	○		8	
2mgセルシン錠	○		8	
セルセプトカプセル250 250mg	○		8	
ゼルヤンツ錠5mg	○		8	
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	×	粉碎	8	
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」	×	粉碎	8	
セレコックス錠100mg→後発切替予定	○		8	
セレスタミン配合錠	○		8	
セレニカR錠200mg	×			徐放性
セレニカR顆粒40%	×			徐放性
セロケン錠20mg	○		8	
ゼンタコートカプセル3mg	×			
センノサイド顆粒8%「EMEC」	○		8	
センノシド錠12mg「トーワ」	×	粉碎	8	粉碎にて8Fr通過→便宜上顆粒へ変更 通過のデータなし
ソバルディ錠400mg	○			
ゾフルーザ錠10mg	○		8	
ゾフルーザ錠20mg	○		8	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	○		8	
ダイアモックス錠250mg	○		8	
ダイフェン配合錠	○		8	
ダイフェン配合顆粒	○		8	
タウリン散98%「大正」	○		8	分散性不良
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	○		8	
タケキャブ錠10mg	○		8	
タケキャブ錠20mg	○		8	
タダラフィル錠5mgZA「あすか」	○		8	
タナトリル錠5 5mg	△	破壊	8	
ダフクリア内服錠200mg	×		-	通過のデータなし
タフマックE配合カプセル	×			
ダーブロック錠1mg	×			データなし
ダーブロック錠2mg	×			データなし
ダーブロック錠4mg	×			データなし
ダーブロック錠6mg	×			データなし
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	○		8	
ダラシンカプセル150mg	○		8	
タリージェ錠2.5mg	○		8	
タリージェ錠5mg	○		8	
タリージェ錠10mg	○		8	
タリージェ錠15mg	○		8	
タリオンOD錠10mg	○		8	
タルグレチンカプセル75mg	×			データなし(抗がん剤曝露注意)
タルチレリンOD錠5mg「アメル」	○		8	
炭酸水素ナトリウム シオエ	○		8	1回量多ければ溶解の水を増やす
炭酸リチウム錠100mg	△	破壊	8	
炭酸リチウム錠200mg	△	破壊	8	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」	○		8	
ダントリウムカプセル25mg	○		8	
タンニン酸アルブミン シオエ	○		8	
タンボコール錠50mg	○		8	
チウラジール錠50mg	○		8	
チガソソカプセル10 10mg	○		8	曝露注意
チザニジン錠1mg「アメル」	○		8	
チラーヂンS散0.01%	○		8	
チラーヂンS錠50μg	○		8	
25mcgチロナミン錠 25μg	○		8	
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	○		8	
つくLA・M配合散	×			水に不溶
ツベルミン錠100mg	×			吸湿性
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒	○		8	
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ四物湯エキス顆粒	○		8	
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	○		8	

	医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
タ	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	○		8	
	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	○		8	
	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	○		8	
	ツルバダ配合錠	△	破壊	8	
	ディナゲスト錠1mg	○		8	
	デエビゴ錠2.5mg	○		8	
	デエビゴ錠5mg	○		8	
	デエビゴ錠10mg	○		8	
	テオドールドライシロップ20%	○		8	
	テオドール錠100mg	×			徐放性、粉碎不可
	テオドール錠200mg	×			徐放性、粉碎不可
	デカドロン錠0.5mg	○		8	
	デカドロン錠4mg	○		8	
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	○		8	
	テグレート細粒50%	○		8	
	テグレート錠200mg	○		8	
	デンコビ配合錠LT	×	水		通過のデータなし
	デンコビ配合錠HT	×	水		通過のデータなし
	テトラミド錠10mg	○		8	
	テトラミド錠30mg	○		8	
	テネリア錠20mg	○		8	
	テノーミン錠50 50mg	○		8	
	テノゼット錠300mg	○		8	
	デノタスチュアブル配合錠	○		8	
	デビケイ錠50mg	×			データなし
	テプレノン細粒10%「トーフ」	○		8	
	デュタステリド錠0.5mgAV「YD」	○		8	女性・小児曝露注意(経皮吸収有)
	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	○		8	
	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	○		8	
	トアラセツ配合錠「DSEP」	△	破壊	8	
	ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	○		8	
	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg	○		8	
	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg	○		8	
	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg	○		8	
	ドパコール配合錠L100	○		8	
	ドパストン散98.5%	○		8	
	トピナ錠50mg	○		8	
	トピナ錠100mg	○		8	
	ドブスOD錠100mg	○		8	
	トフラニール錠25mg	×			
	トラクリア錠62.5mg	○		8	
トラセミドOD錠4mg「TE」	○		8		
トラゼンタ錠5mg	○		8		
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	△	破壊	8		
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	△	破壊	8		
トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	○		8		
トラベルミン配合錠	○		8		
トラマールOD錠25mg	○		8		
トラマールOD錠50mg	○		8		
トランサミン散50%	○		8		
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	○		8		
トリプタノール錠10 10mg	○		8		
トリンテリックス錠10mg	○		8		
トレリーフOD錠25mg	○		8		
経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」 10,000単位1g	○		8		
ナ	ナウゼリンOD錠10 10mg	○		8	
	ナゼアOD錠0.1mg	○		8	
	ナトリックス錠1 1mg	△	破壊	8	
	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	○		8	
	ニコランジル錠5mg「トーフ」	○		8	
	ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	△	破壊	8	
	ニトロールRカプセル20mg	×			徐放性
	ニトロペン舌下錠0.3mg	×			舌下投与
	ニフェジピンCR錠20mg「トーフ」	×			徐放性
	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	×			徐放性
	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	×			徐放性
	乳酸カルシウム「ケンエー」	○		8	
	ニューレプチル細粒10%	○		8	
	ネオール10mgカプセル	○		8	
	ネオール25mgカプセル	○		8	
	ネオール50mgカプセル	○		8	
	ネオドパゾール配合錠	○		8	
	ネキシウムカプセル20mg	○		8	
	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	○	水	8	
	ネシーナ錠25mg	○		8	
	ノイエル細粒40%	×		12	量が多いと閉塞
	ノイロトロピン錠4単位	×			
	ノイロピタン配合錠	○		8	
	ノウリアスト錠20mg	○		8	光に不安定
	ノクサフィル錠100mg	×			腸溶錠。データ無し。
	ノービア錠100mg	○		8	
	ノバミン錠5mg	○		8	
	ノベルジン錠50mg	○		8	
	ノリレン錠25mg	○		8	
	パーキネス錠2 2mg	○		8	
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg	○		8		

医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
ハーボニー配合錠	×		-	通過のデータなし
バイアスピリン錠100mg	×		8	胃腸障害注意、残存リスク有
ハイシー顆粒25%	○		8	
パキシルCR錠12.5mg	×			徐放性、粉碎不可
パキシルCR錠25mg	×			徐放性、粉碎不可
パキシル錠10mg	○		8	
パラシクロビル錠500mg「トーフ」	×	粉碎	8	
バリキサ錠450mg	○		8	
バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	○		8	わずかに残存恐れあり
バルトレックス顆粒50%	×			代替→錠剤の粉碎
バルネチール細粒50%	×			データなし
バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	×			徐放性、粉碎不可
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	×			徐放性、粉碎不可
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	○		8	
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	×		12	
バルモディア錠0.1mg	○		8	
ハロペリドール細粒1%「アメル」	○		8	
ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	○		8	
ハロペリドール錠1.5mg「アメル」	○		8	
ハロペリドール錠3mg「アメル」	○		8	
パントシン散20%	○		8	分散性不良
調剤用バンビタン末	○		8	
PL配合顆粒	○		8	
ピ・シフロール錠0.125mg	○		8	
ピ・シフロール錠0.5mg	○		8	
ピーゼットシー糖衣錠8mg	○		8	
ピートル顆粒分包250mg	○		8	
ピートル顆粒分包500mg	○		8	
ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」	○		8	
ピオフィルミンR散	○	水	8	温湯による生菌数低下の可能性あり
ピオフィルミン配合散	○	水	8	温湯による生菌数低下の可能性あり
ピオブテン顆粒2.5% 0.4g	○		8	
ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	○		8	抗がん剤被爆注意(AG先発データ参照)
ピクタルビ配合錠	×			データなし
ピジクリア配合錠	×			P上昇の可能性
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	○		8	
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	○		8	
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」	○		8	
ピソルボン細粒2%	○		8	
ピソルボン錠4mg	○		8	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「明治」	○		8	
ビタミンB6散10%「マルイシ」	○		8	
ピタメジン配合カプセルB25	○		8	
ヒダントールF配合錠	○		8	
ピドキサール錠20mg	×		8	腸溶錠
ピバンセカプセル20mg	×			データなし
ピバンセカプセル30mg	×			データなし
ピビアント錠20mg	○		8	
ピプレツソ徐放錠50mg	×			徐放性、粉碎不可
ピプレツソ徐放錠150mg	×			徐放性、粉碎不可
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	○		8	
ヒベルナ散10%	△		8	シリンジ内にわずかな固形物の付着および残存
ピムパットドライシロップ10%	○		8	
ピムパット錠50mg	○		8	
ピムパット錠100mg	○		8	
ピモベンダン錠2.5mg「TE」	○		8	
ピラノア錠20mg	○		8	
ピラマイド原末	○		8	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	○		8	局所麻酔作用
ピルトリシド錠600mg	○		8	
ピルナミン細粒10%	○		8	
ピルナミン錠5mg	○		8	
ピルナミン錠25mg	○		8	
ピレスパ錠200mg	○		8	
ピレチア錠(25mg)	○		8	
ファミチジンD錠10mg「サワイ」	○		8	
ファミチジンD錠20mg「サワイ」	○		8	
ファミチジン散10%「サワイ」	○		8	
ファロム錠200mg	×	粉碎	14	溶け残り閉塞可能性。14Fr粉碎で可。
フィコンバ錠4mg	○		8	
フィコンバ錠4mg	○		8	
フィフェンド錠【200mg】	△	破壊	8	
フィフェンド錠50mg→後発切替予定	○		8	
フィフェンド錠200mg→後発切替予定	△	破壊	8	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーフ」	○		8	
フェノバルビタール散10%「マルイシ」	○		8	
フェブリク錠10mg	○		8	
フェブリク錠20mg	○		8	
フェブリク錠40mg	○		8	
フェリセルツ散20% 600mg	×			データなし
フェロ・グラデュメット錠105mg	×			
フェロミア顆粒8.3%	○		8	
フォリアミン錠 5mg	○		8	
フシラミン錠50mg「トーフ」	△	破壊	8	吸湿性
フスコパン錠10mg	○		8	
フライアン錠500mg	×			腸溶錠
フラケニル錠200mg	△	破壊	8	
フラザキサカプセル75mg	×			AUC上昇
フラザキサカプセル110mg	×			AUC上昇
フラジール内服錠250mg	×	粉碎	14	粉碎し、14Frでなら投与可
フラダロン錠200mg	×		8	溶け残りあり閉塞の可能性。
フラニエート配合顆粒 4.73g	×			
フラバスタチンNa錠5mg「トーフ」	○		8	
フラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	○	破壊	8	
フランルカストDS10%「トーフ」	○		8	

医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
ブランカストカプセル112.5mg「トーワ」	○		8	
ブリジスタナイーブ錠800mg	○		8	
フリバスOD錠50mg	○		8	
フリバスOD錠75mg	○		8	
プリモボラン錠5mg	○		8	
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	×			データなし
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	×			崩壊せず詰まる。
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	○		8	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	○		8	
ブレドニゾロン散「タケダ」1%	○		8	
ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	○		8	
ブレドニゾロン錠5mg	○		8	
ブレバミス錠240mg	×			データなし。点滴静注製剤あり。
ブレマリン錠0.625mg	×			吸湿性、通過性不良
プロ・バンサイン錠15mg	○		8	
プログラフカプセル0.5mg	○		8	
プログラフカプセル1mg	○		8	
プログラフ顆粒0.2mg	○		8	
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	×			データなし
プロセキソール錠0.5mg	×			腸溶錠
フロセミド細粒4%「EMEC」	○		8	
フロセミド錠20mg「NP」	○		8	
フロセミド錠40mg「NP」	○		8	
プロタノールS錠15mg	×			
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	○		8	
プロテカジンOD錠10 10mg	○		8	
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	○		8	
プロノン錠150mg	○		8	
塩酸プロピベリン錠10mg「SW」	○		8	
フロベン顆粒8%	-			錠剤は可
ブロムペリドール錠1mg「アメル」	○		8	
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	○		8	
ブロムペリドール細粒1%「アメル」	○		8	
フロリネフ錠0.1mg	○		8	
ベサコリン散5%	○		8	
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	×		-	徐放性
ベシケアOD錠5mg	○		8	
ベタニス錠50mg	×			徐放性
ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」	○		8	
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	○		8	
ベニジピン塩酸塩錠2「サワイ」2mg	△	激しく振盪	8	
ベネクレクタ錠10mg	×			データなし
ベネクレクタ錠50mg	×			データなし
ベネクレクタ錠100mg	×			データなし
ヘパアクト配合顆粒	△	要60ml	8	20ml吸い取り困難。振り混ぜながら。
ヘプセラ錠10 10mg	○		8	吸湿性
ベプリコール錠50mg	○		8	
ベムリディ錠25mg	×		-	通過のデータなし
ペラゾリン細粒400mg	○		8	抗がん剤曝露注意
ペラプロストNa錠20μg「サワイ」	○		8	
ベリチーム配合顆粒	×			
ベルサンチン錠25mg	○		8	
ベルソムラ錠10mg	△	破壊	8	15.20mgデータ参照
ベルソムラ錠15mg	△	破壊	8	
ベルソムラ錠20mg	△	破壊	8	
ヘルベッサ-Rカプセル100mg	×			
ベレキシブル錠80mg	○		8	抗がん剤曝露注意
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	○		8	
ベンザリン細粒1%	○		8	
ベンザリン錠5 5mg	○		8	
ベンザリン錠10 10mg	○		8	
ベントサ顆粒94%	×			製剤特性
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	○		8	
ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	○		8	
ホスミンドライシロップ400 400mg	○		8	
ホスミン錠500 500mg	○		8	
ホスリボン配合顆粒 100mg(リンとして)	○		8	
ホスレノールOD錠250mg	○		8	
ボナロン経口ゼリー35mg	○		8	
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	○		8	
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	×			10分以内に崩壊・懸濁せず
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	○		8	
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	○		8	
ホリゾン錠5mg	○		8	
ボンゾール錠100mg	○		8	
マイスタン細粒1%	○		8	
マイスタン錠5mg	○		8	
マイテラーゼ錠10mg	○		8	
マヴィレット配合錠	×			
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	○		8	
ミコンビ配合錠BP	○		8	
ミゾリピン錠50mg「サワイ」	△	15分	8	
ミチキュアダニ舌下錠3,300JAU	×			舌下錠
ミニリンメルトOD錠60μg	×			原則舌下(一部口腔粘膜吸収)、他剤(デスマモグレンシ点鼻等)検討。製薬会社データ無。
ミニリンメルトOD錠120μg	×			
ミネプロ錠2.5mg	○		8	
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	○		8	
ミノマイシン顆粒2% 20mg	○		8	
ミヤBM細粒	○		8	
ミヤBM錠	○		8	
ミラペックスLA錠0.375mg	×			徐放性
ミラペックスLA錠1.5mg	×			徐放性
ミルタザピン錠15mg「明治」	○		8	
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NP」	○		8	
ミルナシبران塩酸塩錠	○		8	

	医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考	
マ	ムコサールドライシロップ1.5%	×			データなし	
	ムコスタ顆粒20%	○		8		
	ムルブレタ錠3mg	×			データなし	
	メイラックス錠1mg	○		8		
	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	○		8		
	メコバラミン錠500「トーワ」0.5mg	△	破壊	8		
	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	×			腸溶錠	
	メスチノン錠60mg	○		8		
	メーゼント錠0.25mg	×			データなし	
	メーゼント錠2mg	×			データなし	
	メタルカプターゼカプセル100mg	○		8		
	メチコパール細粒0.1% 500mg	○		8		
	メチルエルゴメリン錠0.125mg「あすか」	○		8	光で着色	
	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイヨー」	○		8		
	メトグルコ錠250mg	○		8		
	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	○		8		
	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	○		8		
	メトピロンカプセル250mg	○		8	シリンジ・チューブ付着量不明(ハ)	
	メトリジンD錠2mg	○		8		
	メトレート錠2mg	○		8		
	メドロール錠2mg	○		8		
	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	△	破壊	8	曝露注意	
	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」	○		8	光で分解	
	メファキン「ヒサミツ」錠275 275mg	×			懸濁試験のみ、資料提供無し	
	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	○		8		
	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」	○		8		
	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	○		8		
	メマリーOD錠5mg→後発切替予定	○		8	OD	
	メマリーOD錠10mg→後発切替予定	○		8	OD	
	メマリーOD錠20mg→後発切替予定	○		8	OD	
	メルカゾール錠5mg(製剤変更品)	△	破壊	8		
	モービック錠10mg	○		8		
	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	○		8		
	モディオダール錠100mg	×			データなし	
	モーパー錠100mg	○		8		
	モビコール配合内用剤 6.8523g	○		8		
	モンテルカストOD錠10mg「明治」	○		8		
	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	○		8	フラッシュ必要	
	ヤ	ヤース配合錠	×			データなし(ホルモン剤→曝露注意)
		ユーエフティE配合顆粒T150 150mg(テガフル相当量)	×			
ユーゼル錠25mg		○		8		
ユービット錠100mg		○		8	粉碎不可	
ユーロジン2mg錠		○		8		
ユナシン細粒小児用10% 100mg		×		18		
ユペラNカプセル100mg		○		8		
ユペラ錠50mg		×		-	光→ユペラNへ	
ユリノーム錠50mg		○		8		
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		×			データなし	
ラ	ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.167%	○		8	ゼリーの残りあるが通過性○	
	ラスビック錠75mg	×	粉碎	12	ペンチで粉々に破壊要す	
	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	×		-	腸溶性	
	ラツダ錠20mg	○		8		
	ラツダ錠40mg	○		8		
	ラツダ錠60mg	○		8		
	ラツダ錠80mg	○		8		
	ラボナ錠50mg	○		8		
	ラミクター錠25mg	○		8		
	ラミクター錠100mg	○		8		
	ラミクター錠小児用2mg	○		8		
	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	△	水	8	水で溶解、直ちに投与	
	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	△	水	8	水で溶解、直ちに投与	
	リアルダ錠1200mg 1, 200mg	×		-	放出制御製剤	
	リーゼ錠5mg	○		8	光	
	リーマス錠200 200mg	△	破壊	8	胃腸障害注意	
	リウマトレックスカプセル2mg	○		8	曝露注意	
	リオナ錠250mg	○		8		
	リオレサル錠5mg	○		8		
	リクシアナOD錠30mg	○		8		
	リクシアナOD錠60mg	○		8		
	リザベンカプセル100mg	○		8		
	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	○		8		
	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	○		8		
	リスペリドン細粒1%「トーワ」	○		8		
	リスマー錠1mg	○		8		
	リズミック錠10mg	○		8		
	リタリン錠10mg	○		8		
	リトリン塩酸塩錠5mg「あすか」	○		8		
	リネゾリド錠600mg「サワイ」	○		8		
	リパクレオンカプセル150mg	×			腸溶性	
	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	○		8		
	リフキシマ錠200mg	○		8		
	リボトリール細粒0.1%	○		8		
	リボトリール錠0.5mg	○		8		
	リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	○		8		
	リリカOD錠25mg	○		8		
	リリカOD錠75mg	○		8		
	リリカOD錠150mg	○		8		
	リルゾール錠50mg「タナベ」	△	破壊	8		
	リンゼス錠0.25mg	○		8		
	ルーラン錠4mg	○		8		
	ルジオミール錠25mg	○		8	苦味、舌麻痺	
	ルナベル配合錠LD	○		8	資料提供不可	
	ルネスタ錠1mg	○		8		
	レキササルティ錠1mg	○		8		
レキササルティ錠2mg	○		8			

	医薬品名	可否 (○△×)	条件	最少 通過Fr	備考
	レキソタン錠2 2mg	○		8	
	レキップCR錠2mg	×			徐放錠
	レキップCR錠8mg	×			徐放錠
	レクサプロ錠10mg	○		8	
	レクシヴァ錠700 700mg	△	破壊	8	
	レクチゾール錠25mg	○		8	
	レグテクト錠333mg	×			腸溶錠
	レグナイト錠300mg	×			徐放性
	レグパラ錠12. 5mg	○		8	
	レタマイシンカプセル150mg	○		8	
	レナジェル錠250mg	○		8	
	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	○		8	
	レバチオ錠20mg	○		8	
	レバミピド錠100mg「Me」	○		8	
	レベトールカプセル200mg	○		8	催奇形性あり 曝露防止策が必要
	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	○		8	
	レボフロキサシンOD錠250mg「トーフ」	○		8	
	レボレード錠12. 5mg	○		8	
	レミッチOD錠2. 5μg	○		8	
	レミニールOD錠4mg→後発切替予定	○		8	
	レミニールOD錠8mg→後発切替予定	○		8	
	レルパックス錠20mg	○		8	
	レルミナ錠40mg	○		8	
	ロイケリン散10%	○		8	抗がん剤曝露注意
	ロイコン錠10mg	○		8	
	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	△	破壊	8	
	ロケルマ懸濁用散分包5g	○		8	
	ロケルマ懸濁用散分包10g	○		8	
	ロサルタンK錠50mg「トーフ」	△	破壊	8	
	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「サワイ」	○		8	
	ロゼレム錠8mg	○		8	
	ロドピン錠50mg	○		8	
	ロペラミド錠1mg「EMEC」	○		8	
	ロラゼパム錠0. 5mg「サワイ」	○		8	
	ロラタジンOD錠10mg「AA」	○		8	
	ワーファリン錠1mg	○		8	
	ワーファリン顆粒0. 2%	○		8	
ワ	ワゴスチグミン散(0. 5%)	○		8	
	ワソラン錠40mg	△	破壊	8	
	ワントラム錠100mg	×			徐放性

呉医療センター薬剤部
2021年1月改訂